duemila24

GreenSol
BIO SCIENCE

CATALOGO
NUTRI SCIENCE

SOLUZIONI INNOVATIVE AD ALTO RENDIMENTO

25 YEARS

LINEA

Fitoregolatori

- ALFA
- ARAMIS PLUS
- GIBB PLUS
- KYODAI
- NU-GIB TB
- ULTRASTIM 312

ALFA

FITOREGOLATORE PER STIMOLARE FIORITURA E ALLEGAGIONE, AUMENTARE LA PEZZATURA E RIDURRE LA CASCOLA DEI FRUTTI

ALFA è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo, con attività complementari quali l'anticipo della fioritura e della maturazione, maggiore allegagione, pezzatura uniforme, migliore colore della frutta.

VANTAGGI E FINALITÀ

- Anticipa la fioritura delle piante.
- Migliora l'allegagione anche in condizioni ambientali avverse.
- Incrementa la pezzatura dei frutti e li rende più uniformi.
- Aumenta la produttività.

FITOTOSSICITÀ

ALFA è fitotossico per le pere Decana del Comizio.

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE n. 10485 del 10/05/2000.
Titolare dell'autorizzazione: Nufarm Italia S.r.l.

COMPOSIZIONE

NAA (acido α-naftalenacetico) puro	**0,3 g (3 g/L)**
Acido Gibberellico	**0,1 g (1 g/L)**

INTERVALLO DI SICUREZZA

27 giorni per Fragola
20 giorni per tutte le altre Colture

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Pero, Melo	100-150 ml/hl	**Per una migliore allegagione**, effettuare un trattamento nella fase di fioritura quando il 20-30% dei fiori sono aperti.
	150-200 ml/hl	**Come anticascolante**, intervenire ai primi sintomi della cascola.
Fragola	100-150 ml/hl	**Per l'anticipo della fioritura ed una più precoce raccolta**, intervenire con 2 o più trattamenti: il primo 20-30 giorni prima della prevista fioritura e il secondo dopo l'allegione.
Carciofo	150-200 ml/hl	**Per anticipare la produzione dei capolini**, intervenire alla formazione del primo abbozzo fiorale. Ripetere il trattamento ogni 15-20 giorni.
Pomodoro	150-200 ml/hl	**Per una maggiore fioritura, allegagione, pezzatura e colorazione dei frutti**, intervenire con 2 o più trattamenti irrorando tutta la vegetazione. Il primo trattamento deve essere effettuato alla dose di 150 ml/hl prima della fioritura; il secondo ed i successivi dopo la formazione dei primi frutti.
Zucchino	150-200 ml/hl	**Per favorire l'ingrossamento dei frutti ed una più uniforme e anticipata pezzatura**, intervenire con 2 o più trattamenti; il primo appena formati i primi frutticini, irrorando tutte le piante. Ripetere il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni appena si sono formati i nuovi frutti.
Spinacio	150-200 ml/hl	**Per un più precoce sviluppo e dimensione fogliare**, sono consigliati 2 o più trattamenti a distanza di 15-20 giorni.
Colture Floricole (in serra ed in pieno campo)	150-200 ml/hl	**Per aumentare la fioritura e per la formazione di fiori più grossi**, sono consigliati 3 o più trattamenti a distanza di 10-20 giorni, a partire dalle prime fasi di piena attività vegetativa.

CODICE CONFEZIONE

GF0452	8 029816 054528	FLACONE	12x1 L	IVA 10%

ARAMIS PLUS

FITOREGOLATORE BRACHIZZANTE PER MIGLIORARE L'ALLEGAGIONE E RIDURRE LA RUGGINOSITÀ SU MELO E PERO

ARAMIS PLUS è un fitoregolatore di crescita delle piante, che influenza in modo positivo i processi fisiologici del melo e del pero con un incremento della qualità e della produzione; è dato dall'unione delle gibberelline A4 - A7 e dalla 6-benziladenina.

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- La quantità totale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Quando si effettua il trattamento è bene aggiungere un Bagnante adesivo o un concime fogliare azotato organico per avere una migliore azione.
- Trattare piante sane e vigorose con interventi fatti al mattino o tardo pomeriggio.
- Non trattare con temperature inferiori a 7°C.
- Irrorare con getto finemente nebulizzato e bagnare uniformemente tutta la massa fiorale, senza però arrivare allo «sgocciolamento».
- Non effettuare l'eventuale diradamento prima di 4-5 giorni dall'ultimo trattamento.
- Miscelare la dose stabilita di **ARAMIS PLUS** in circa metà della quantità di acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume richiesto.
- Mantenere la soluzione in costante agitazione, anche durante la fase di distribuzione (utilizzare la soluzione entro 24 ore dalla sua preparazione).
- Eseguire il trattamento solo quando è prevedibile che non piova entro 4-6 ore dall'applicazione e comunque nel caso si intervenga dopo una pioggia, attendere che la vegetazione sia completamente asciutta.

COMPATIBILITÀ

ARAMIS PLUS è compatibile con bagnanti, concimi fogliari, zolfo bagnabile ed altri fungicidi comunemente usati in frutticoltura. Durante la preparazione della miscela, è opportuno aggiungere ARAMIS PLUS nella dose richiesta per ultimo. Evitare di miscelare al prodotto sostanze alcaline (polisolfuri, Poltiglia bordolese).

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE n. 15502 del 15/10/2012.
Titolare dell'autorizzazione: Globachem NV

COMPOSIZIONE

Gibberelline pure (Isomero A4 + A7)	**1,8 g (19,1 g/L)**
6-Benziladenina pura	**1,8 g (19,1 g/L)**

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Melo *(Gruppo Delicious)*	70-90 ml/hl in totale	**Miglioramento della forma:** trattare con dose d'impiego di 70-90 ml/hl totali (dose minima indicata negli impianti con meno esigenze e dose massima soprattutto nelle zone di pianura e più calde) dalla piena fioritura (80% dei fiori aperti) alla caduta dei petali. I trattamenti vanno effettuati in modo frazionato, con 2 interventi distanziati di 7 giorni, alla dose di 35-50 ml/hl, non superando il totale del dosaggio consigliato, in quanto si ha il vantaggio di apportare prodotto in più momenti dello sviluppo delle piante.
Melo *(Golden Delicious)*	60-120 ml/hl in totale	**Prevenzione della ruggine:** si interviene trattando da metà - fine fioritura alla dose di 60-120 ml/hl totali, con 3-4 interventi frazionati, distanziati di circa 8 - 10 giorni.
Melo non in produzione e Vivai	4,5-5,5 L/ha (2,5 L/hl)	**Anticipo di branchette su astoni:** trattare a 5 L/ha equivalenti a 2,5 L/hl su astoni della lunghezza di 50 - 70 cm che siano in piena crescita e con buon apparato fogliare. Bisogna effettuare in modo preciso la bagnatura della zona apicale (i 30 cm superiori).
Pero	60-80 ml/hl in totale	**Miglioramento dell'allegagione:** trattare a 60-80 ml/hl, con 2 applicazioni (di preferenza) a 30-40 ml/hl, con il primo trattamento quando si ha il 25% circa dei fiori aperti ed il secondo dopo circa 2-3 giorni al massimo.

CODICE CONFEZIONE

GF0303	8 029816 053033	FLACONE	20x500 ml	IVA 10%

GIBB PLUS

FITOREGOLATORE CONTRO LA RUGGINOSITÀ E PER LA BUONA FIORITURA E ALLEGAGIONE DEI FRUTTI DEL MELO E DEL PERO

GIBB PLUS è un fitoregolatore che trova interessanti campi d'impiego su alcune cultivar di melo e pero. In determinate situazioni ambientali, i frutti delle mele appartenenti al Gruppo Delicious rosse, sia normali che Spur, tendono ad assumere una forma schiacciata, **GIBB PLUS** provoca una modifica della forma (allungamento) secondo gli standard varietali delle zone più vocate. **GIBB PLUS** sulle mele della varietà Golden Delicious previene o riduce significativamente la rugginosità, fisiopatia che causa un importante deprezzamento della produzione. Il prodotto ha dimostrato di diminuire i danni da gelo e quindi di aiutare l'allegagione nei casi di gelate durante la fioritura; in questo caso trattare entro 24 ore dalla gelata, nelle ore più calde, e ripetere eventualmente l'intervento in caso di perdurare delle gelate.

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- La quantità totale di soluzione per ettaro dovrà essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.
- Aggiungere 50-100 ml/hl di un BAGNANTE non ionico, avendo cura di metterlo prima del GIBB plus
- Mettere la dose prestabilita di **GIBB PLUS** in circa la metà dell'acqua necessaria e, mantenendo la soluzione in agitazione, aggiungere altra acqua sino al raggiungimento del volume totale richiesto.
- Mantenere in agitazione la soluzione anche durante la distribuzione, provvedendo al suo impiego nello stesso giorno della preparazione.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, bagnando uniformemente la massa fiorale ed evitando lo «sgocciolamento».
- Trattare in assenza di pioggia per almeno 4-6 ore dopo l'applicazione; nel caso di trattamento dopo una pioggia, attendere che la vegetazione si asciughi.
- Trattare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio e comunque con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con le sostanze alcaline quali polisolfuri e Poltiglia bordolese. Durante la preparazione di miscele, aggiungere **GIBB PLUS** per ultimo.

FITOTOSSICITÀ

L'impiego del **GIBB PLUS** in prossimità di interventi con prodotti diradanti, può accentuare l'effetto diradante degli stessi: pur essendo tale aspetto talvolta ricercato, si raccomanda particolare attenzione allo scopo di evitare danni alla produzione.

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE

n. 12989 del 28/11/2008.
Titolare dell'autorizzazione:
Globachem NV

COMPOSIZIONE

Gibberelline pure (isomero A4 + A7) **0,97 g (10 g/L)**

FORMULAZIONE

Concentrato solubile

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Melo *(Gruppo Delicious rosse)*	100-130 ml/hl in totale	**Miglioramento della forma:** applicare distribuendo il prodotto tra la piena fioritura (80% di fiori aperti) e la caduta petali, preferibilmente in 2 applicazioni di 50-80 ml/hl ciascuna ad intervallo di 7-10 giorni.
Melo *(Golden Delicious)*	40-50 ml/hl	**Prevenzione della rugginosità:** Impiegare realizzando un programma di 3-4 applicazioni; effettuare il primo trattamento a fine fioritura e i successivi ad intervalli di 7-10 giorni.
Melo *(Gruppo Gala)*	30-40 ml/hl	**Favorisce il miglioramento della forma, anticipa l'emissione e lo sviluppo dell'apparato fogliare, migliora l'omogeneità della fioritura, incrementa la quantità raccolta al primo stacco:** fare 4 applicazioni distanziate di 15 giorni in pre-fioritura (orecchiette di topo e mazzetti) e ad ingrossamento dei frutti (frutto noce).
Altre varietà di Melo	50-60 ml/hl	Impiegare durante la fioritura ripetuto per 2 volte.
Pero	80-100 ml/hl in totale	**Miglioramento dell'allegagione:** distribuire il prodotto all'inizio della fioritura, preferibilmente in 2 applicazioni di 40-50 ml/hl, effettuando il primo trattamento al 30-40% di fiori aperti ed il secondo entro 2-3 giorni.

CODICE CONFEZIONE

GF0187	8 029816 051879	FLACONE	12x1 L	IVA 10%

KYODAI

FITOREGOLATORE PER L'ANTICIPO DELLA FIORITURA E AUMENTO DELLA PEZZATURA DI AGRUMI, FRAGOLA, CARCIOFO, VITE E ORTAGGI

KYODAI è un fitoregolatore con azione di stimolo sullo sviluppo vegetativo con azioni complementari quali l'anticipo della fioritura, della maturazione, maggior allegagione, pezzature uniformi, miglior colore della frutta.

VANTAGGI E FINALITÀ

- Anticipa la fioritura delle piante.
- Migliora l'allegagione anche in condizioni ambientali avverse.
- Incrementa la pezzatura dei frutti e li rende più uniformi.
- Aumenta la produttività.
- Induce l'allungamento dei germogli, rimuove la dormienza di bulbi, stoloni e semi.

MISCIBILITÀ

KYODAI non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati, eccetto con altri fitoregolatori.
È miscibile con i fertilizzanti fogliari anche se si consiglia di effettuare sempre piccoli saggi per verificarne la compatibilità.

FITOTOSSICITÀ

KYODAI è fitotossico per le pere *Decana del Comizio*.

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE N. 14779 DEL 25/02/2011.
Titolare dell'autorizzazione: Nufarm Italia S.r.l.

COMPOSIZIONE

Acido gibberellico (isomero GA3) puro **2 g (21 g/L)**

INTERVALLO DI SICUREZZA

20 giorni per tutte le Colture

FORMULAZIONE

Liquido

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Agrumi	50-100 ml/hl 70-120 ml/hl	Su **Arancio, Limone e Pompelmo** trattando all'inizio dell'invaiatura. Su **Clementino** prima della fioritura. Il trattamento è effettuato **per migliorare la qualità della buccia e per ridurre la cascola**.
Fragola	100-140 ml/hl	**Per l'anticipo della fioritura ed una precoce raccolta**, con 2 trattamenti ad un mese e mezzo dalla prevista fioritura.
Pero	50-100 ml/hl 100-150 ml/hl	**Per favorire l'allegagione**, con fiori aperti al 20%-30%. **In caso di gelate in fioritura**, trattare entro 48 ore dalla gelata per limitare il danno, utilizzando 15 hl di acqua per ha.
Carciofo	50-100 ml/hl	**Per anticipare la produzione dei capolini**, trattare quando si forma il primo abbozzo fiorale, e non oltre la sesta foglia.
Vite	150-250 ml/hl	**Per una migliore allegagione**, effettuare un trattamento pre-fiorale; **contro l'acinellatura**, effettuare un trattamento post-fiorale.
Patata	5-20 ml/hl	**Per interrompere la dormienza** immergere i tuberi per qualche minuto prima di metterli a dimora, in una soluzione di **5 ml/hl** per tuberi tagliati e **20 ml/hl** per tuberi interi.
Colture floricole	40-70 ml/hl	**Per aumentare la fioritura ed incrementare la formazione di fiori più grossi.** Alla dose minima si può intervenire ogni 20-30 giorni iniziando alla comparsa dei primi boccioli.

CODICE CONFEZIONE

GF0278	8 029816 052784	FLACONE	12x1 L	IVA 10%

NU-GIB TB

FITOREGOLATORE A BASE DI ACIDO GIBBERELLICO IN COMPRESSE

NU-GIB TB è un fitoregolatore di crescita a base di una sostanza vegetale naturale (Acido Gibberellico) che influenza molti processi biologici delle piante: sviluppo, fioritura, anticipo della produzione.
Questa sostanza somministrata alle piante in determinati momenti e dosi, produce effetti positivi ai fini desiderati (allegagione, precocità).

NOTE PER UN CORRETTO IMPIEGO

- Aggiungere sempre 50 ml/hl di un BAGNANTE, avendo cura di metterlo prima di **NU-GIB TB**.
- Il prodotto deve essere impiegato in giornate di tempo buono e stabile (evitare l'impiego quando si prevedono piogge imminenti).
- Applicare la miscela subito dopo la sua preparazione e comunque entro le 24 ore successive.
- Trattare preferibilmente nelle ore più fresche del giorno, con temperature non inferiori a 7°C o superiori a 32°C.
- Impiegare nella distribuzione un getto finemente nebulizzato, per migliorare la copertura sulla vegetazione e di conseguenza l'assorbimento del prodotto da parte delle piante.

COMPATIBILITÀ

NU-GIB TB non è compatibile con prodotti a reazione alcalina. Tuttavia considerate le numerose colture sulle quali è impiegabile il prodotto e le variabili miscele con altri prodotti si raccomandano test preventivi prima di utilizzare il **NU-GIB TB** in miscela con altri formulati su vasta scala.

FITOTOSSICITÀ

Con il variare delle condizioni ambientali, dello stadio fenologico delle piante e delle diverse varietà si possono ottenere risultati molto diversi. Si consiglia perciò di effettuare test su piccole superfici, applicando le dosi più basse sulle varietà mai trattate prima di effettuare interventi su superfici più ampie. Acclarare localmente le tecniche d'impiego.

ATTENZIONE:
H319

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE

n. 14179 del 18/03/2008.
Titolare dell'autorizzazione:
Nufarm Italia S.r.l.

COMPOSIZIONE

Acido gibberellico puro **20 g**
(1 compressa contiene 1 g di p.a. puro)

INTERVALLO DI SICUREZZA

20 giorni per tutte le Colture

FORMULAZIONE

Compresse effervescenti solubili in acqua

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Pero	1-2 compresse/hl	**Per favorire la partenocarpia e stimolare lo sviluppo della fruttificazione normale**, si deve trattare nel periodo compreso fra l'inizio (20-30%) di fiori aperti e la piena fioritura, impiegando non meno di 10 hl/ha di soluzione.
Arancio	2-4 compresse/hl	**Per avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione** sulle varietà Moro, Tarocco e Sanguinella, trattare poco prima della colorazione dei frutti avendo cura di bagnare abbondantemente.
Clementine, Mandarino	1-2 compresse/hl	**Per favorire l'allegagione** trattare quando la maggior parte dei fiori è in piena fioritura o inizia a perdere petali.
Limone	1-2 compresse/hl	**Per aumentare colore e pezzatura dei frutti e per uniformare le raccolte** trattare circa 5-7 settimane prima della prima raccolta e con il colore della maggioranza dei frutti che comincia a virare al giallo-argenteo.
Carciofo	1-2 compresse/hl	**Per anticipare la produzione**, trattare al momento in cui si nota la formazione delle infiorescenze.
Fragola in coltura protetta	2-3 compresse/hl	**Per stimolare l'allegagione** applicare il prodotto 15-20 giorni prima della fioritura impiegando 5-8 hl/ha di soluzione.
Colture floreali	1-2 compresse/hl	**Per anticipare ed aumentare la fioritura e migliorare talvolta la qualità dei fiori** stessi, trattare quando compaiono i boccioli.
Patata	1/10 o 1/2 compressa/hl	**Per stimolare l'emissione regolare dei germogli nei tuberi da seme**, si immergono per 10 minuti in una soluzione di 1/10 di compressa/hl in caso di tuberi selezionati e 1/2 compressa/hl per tuberi interi, avendo cura di asciugare i tuberi e seminare subito dopo; nel caso di tuberi provenienti da magazzino di conservazione, lasciare trascorrere 3-4 settimane di pre-germinazione.
Vite: uva da tavola senza semi	2-3 compresse/hl	**Per allungare il rachide** trattare in pre-fioritura con tralcio di 4-8 cm (2 compresse/hl); **per diradare il grappolo** trattare al 30-40% della fioritura (2 compresse/hl); **per aumentare le dimensioni degli acini trattare dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro (3 compresse/hl)**.
Vite: uva da vino con semi	0,5-1 compresse/hl	**Per allungare il rachide** sulle varietà a grappolo compatto tipo Tocai, Picolit, Chardonnay, ecc., trattare prima della fioritura con tralci di 10-15 cm impiegando 200-300 L/ha di acqua.
Ciliegio dolce	1-2 compresse/hl	**Per aumentare la consistenza e la pezzatura** trattare all'epoca dell'invaiatura.
Ciliegio acido	1-2 compresse/hl	**Per la riduzione dei danni provocati dal "Giallume virotico", per la scarsa vigoria e bassa produzione,** trattare 10-14 giorni dopo la caduta dei petali.
Sedano, Pomodoro, Spinacio, Zucchino	2-4 compresse/hl	**Per la stimolazione dello sviluppo e per limitare lo stress da freddo,** trattare 4-5 settimane prima della raccolta impiegando 300-500 L/ha di soluzione.

CODICE CONFEZIONE

GF0207	8 029816 052074	ASTUCCIO CON COMPRESSE DA 5g	25x10 COMPRESSE	IVA 10%

ULTRASTIM 312

FITOREGOLATORE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE PIANTE

ULTRASTIM 312 è un formulato messo a punto in modo specifico per stimolare lo sviluppo delle piante. Il prodotto è a base di un auxino simile sintetico, l'acido α-naftalenacetico, che promuove la distensione e la divisione cellulare nei tessuti giovani, fornendo quindi un valido stimolo allo sviluppo della struttura della pianta.
ULTRASTIM 312 è un prodotto caratterizzato da un'esclusiva formulazione ad azione plastica grazie alla presenza dell'acido α-naftalenacetico con l'aggiunta di azoto, fosforo, potassio e microelementi.

VANTAGGI E FINALITÀ

- Acceleratore dei processi di crescita (NAA + NPK con rapporto spostato verso l'azoto).
- Massima purezza dei componenti e pronta solubilità.
- Permette una ottimale produzione dei tessuti vegetativi e riproduttivi.
- Stimola la distensione cellulare e l'allungamento dei germogli, in occasione di stress dovuti ad avversità ambientali.
- Aumenta la produttività delle piante.
- Consente elevati standard qualitativi delle produzioni.

REGISTRAZIONE MINISTERO SALUTE n. 10699 del 31/01/2001.
Titolare dell'autorizzazione: Nufarm Italia S.r.l.

COMPOSIZIONE

NAA (acido alfa α-naftalenacetico) puro **0,01 g**

INTERVALLO DI SICUREZZA

7 giorni per piante Frutticole e Orticole
24 giorni per Olivo
27 giorni per Fragola ed Asparago

FORMULAZIONE

Polvere solubile

MODALITÀ DI APPLICAZIONE E DOSI CONSIGLIATE

COLTURE	DOSI	MOMENTO DELL'APPLICAZIONE
Talee erbacee, legnose e arbustive di piante Ornamentali e da Frutto	1 g/5 L di acqua	Per evitare la crisi del trapianto: immergere l'apparato radicale della piantina da trapiantare ed irrorare subito dopo la messa a dimora, con una soluzione alla dose di 1 g in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria. Ripetere il trattamento per 4-5 volte ad intervalli settimanali.
Melo, Pero, Pesco, Olivo, Fragola, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Zucchino, Spinacio, Asparago, Carciofo, Radicchio	20 g/hl	Per anticipare la crescita di piante Frutticole ed Orticole: irrorare abbondantemente le foglie con la soluzione ottenuta, diluendo il formulato alla dose di 20 g/hl di acqua o soluzione antiparassitaria. I trattamenti vanno effettuati durante il periodo di vegetazione e ripetuti almeno 4-5 volte a distanza di 10-15 giorni, utilizzando 300-400 litri di acqua per ettaro.
Colture Floreali e Ornamentali	1 g/5 L di acqua	Diluire il formulato alla dose di 1 g in 5 litri di acqua o soluzione antiparassitaria ed irrorare 1 o 2 volte alla settimana per tutto il periodo della crescita.

CODICE CONFEZIONE

GF0128	8 029816 051282	BUSTA	20x1 Kg	IVA 10%

GreenSol
BIO SCIENCE

Le informazioni contenute in questo catalogo sono destinate esclusivamente agli agenti di vendita, ai rivenditori e agli operatori professionali. Quanto riportato, anche se redatto sulla base di ricerche ed usi, si intende semplicemente a titolo informativo. Green Ravenna srl non risponde di eventuali danni causati dall'uso dei prodotti in dosaggi e/o in modalità non conformi a quanto indicato nella etichetta. I Prodotti fitosanitari sono Autorizzati dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. **Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto con particolare attenzione alle prescrizioni supplementari, ai pittogrammi e le frasi di pericolo per un uso sicuro del prodotto.**

GreenSol
BIO SCIENCE

Distribuito da: **Green Ravenna** Srl
Sede legale: Via Matteotti, 16 - 48121 Ravenna | **Sede operativa**: Via Dell'Artigiano, 21 - 48033 Cotignola (RA)
Tel. 0545 908980 | **Fax** 0545 908990 | **Email:** info@greenravenna.it

www.greenravenna.it