

# FOXTAIL

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA  
PER TAPPETI ERBOSI  
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

COMPOSIZIONE:

Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)  
Coformulanti q.b. a g 100

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**

Via Fratelli Bronzetti 32/28  
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:

**Chemia S.p.A.** - S. Agostino (FE)  
**I.R.C.A. Service S.r.l.** - Fornovo S. Giovanni (BG)  
**Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI)

**CHEMINOVA A/S**

Thyborønvej 78 DK-7673 Harbøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500, 750; litri 1, 5, 10, 20

Distribuito da: Parità n.:

**Compo Italia S.r.l.**

via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 03625121

**ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.**

via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

**ITAL-AGRO S.r.l.** - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

**Green Ravenna srl** - Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna - Tel. 0545-012280

**Copyr SpA** - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1

**Sepran Srl** - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562

**VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.**

via Desman 43 - 35010 S.Eufemia di Borgoriccio (PD) - Tel. 049 9337111

**Arysta LifeScience Italia S.r.l.**

Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

**KOLLANT Srl** - via C. Colombo 7/7 A - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica**

**cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273**

**Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.**

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.**

**- In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;**

**- Togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;**

**- Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;**

**- Non provocare il vomito.**

**Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.**

**Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.**

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni**

### CARATTERISTICHE

FOXTAIL può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.

CARATTERISTICHE D'AZIONE: il prodotto agisce per assorbimento fogliare.

**Erbe infestanti sensibili:** Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare FOXTAIL dopo l'emergenza delle erbe infestanti.

- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Sorghum halepense da seme:

- 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante

- 5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti

- 7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti

- 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactylon, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.

- 0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE

- Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua

- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOXTAIL in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.

Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.

Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.

La semina di infoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.

Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

### FITOTOSSICITÀ

Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

### COMPATIBILITÀ

Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. FOXTAIL non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

# FOXTAIL

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI  
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

COMPOSIZIONE:

Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)  
Coformulanti q.b. a g 100

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**

Via Fratelli Bronzetti 32/28  
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:

**Chemia S.p.A.** - S. Agostino (FE)  
**I.R.C.A. Service S.r.l.** - Forno S. Giovanni (BG)  
**Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI)

**CHEMINOVA A/S** - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100

Partita n.:



**ATTENZIONE**

Distribuito da:

**Compo Italia S.r.l.** - via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 03625121

**ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.** - via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

**ITAL-AGRO S.r.l.** - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

**Green Ravenna srl** - Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna - Tel. 0545-012280

**Copyr SpA** - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1

**Sepran Srl** - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562

**VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.** - via Desman 43 - 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111

**Arysta LifeScience Italia S.r.l.** - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

**KOLLANT Srl** - via C. Colombo 7/7 A - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO  
NELL'AMBIENTE**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04/02/2016 e modificata ai sensi dell'articolo 7,

comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 12/11/2017.

# FOXTAIL (PFnPE)

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA  
PER TAPPETI ERBOSI  
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2019; nel caso di concessione di proroga della scadenza del prodotto, la suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

COMPOSIZIONE:

**Fenoxaprop-p-etile puro** g 2,75 (=28 g/L)  
**Coformulanti q.b. a** g 100

**CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**

Via Fratelli Bronzetti 32/28  
24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:

**Chemia S.p.A.** – S. Agostino (FE)

**I.R.C.A. Service S.r.l.** - Fornovo S. Giovanni (BG)  
**Torre S.r.l.** – Torrenieri (SI)

**CHEMINOVA A/S**

Thyborøvej 78 DK-7673 Harbøre (Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100, 250, 500

Distribuito da:

Partita n.:

**Compo Italia S.r.l.**

via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 03625121

**ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.**

via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

**Green Ravenna srl** - Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna - Tel. 0545-012280

**Copyr SpA** - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1

**Sepran Srl** - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l.

via Desman 43 - 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111

**Arysta LifeScience Italia S.r.l.**

Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

KOLLANT Srl - via C. Colombo 7/7 A - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.**

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi del principio attivo nell'animale da esperimento, passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.**

**- In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico;**

**- Togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con acqua e sapone;**

**- Risciacquare gli occhi contaminati con acqua per 10-15 minuti;**

**- Non provocare il vomito.**

**Trattamenti specifici: In caso di ingestione, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con ca. 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Fare attenzione a prevenire l'aspirazione polmonare per la presenza di solventi organici contenuti nel formulato. Mantenere una adeguata aerazione. Trattamenti sintomatici.**

**Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.**

**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni**

### CARATTERISTICHE

FOXTAIL può essere utilizzato contro le erbe infestanti dei tappeti erbosi costituiti da: Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra, Festuca arundinacea, Poa annua, Zoysia spp., Agrostis palustris tagliata ad altezza non inferiore ai 5 millimetri e solo dopo la prima stagione di crescita.

**CARATTERISTICHE D'AZIONE:** il prodotto agisce per assorbimento fogliare.

**Erbe infestanti sensibili:** Sanguinella sottile (Digitaria ischaemum), sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), giavone (Echinochloa crus-galli), pabbio (Setaria spp.), sorghetta da seme (Sorghum halepense); con trattamenti ripetuti: gramigna (Cynodon dactylon), sorghetta da rizoma (Sorghum halepense).

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Utilizzare FOXTAIL dopo l'emergenza delle erbe infestanti.

- contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, Echinochloa crusgalli, Setaria spp., Sorghum halepense da seme:

- 2,5 - 3,5 l/ha da 3 foglie a 2 culmi di accestimento dell'infestante

- 5,0 l/ha per tappeti costituiti da Poa pratensis, Zoysia spp, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti

- 7,0 l/ha per tappeti costituiti da Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea, Poa annua, oltre i 3 culmi di accestimento delle infestanti

- 3,0-4,0 l/ha contro Cynodon dactylon, Sorghum halepense da rizoma: iniziare i trattamenti subito dopo la ripresa vegetativa delle infestanti, ripetendo il trattamento ogni 4-7 settimane per mantenere l'arresto dell'accrescimento.

- 0,5 l/ha contro Digitaria ischaemum, Digitaria sanguinalis, su tappeti di Agrostis palustris, con infestanti a 1-2 foglie; ripetere i trattamenti allo stesso stadio, con intervalli di almeno 3 settimane.

Nei casi di emergenze scalari delle infestanti ripetere il trattamento dopo almeno 2 settimane su infestanti in attiva crescita; non superare la quantità totale di 22 l/ha per stagione vegetativa.

VOLUME DI IRRORAZIONE

- Trattamenti a pieno campo: 300-600 l/ha di acqua

- Trattamenti localizzati: 50-100 ml di FOXTAIL in 10 litri di acqua, da 1-4 foglie a 1-2 culmi di accestimento delle infestanti.

L'accurata bagnatura delle infestanti è determinante per il buon esito del trattamento.

Non distribuire il prodotto con sistemi di irrigazione.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Trattare prima del taglio quando è presente la massima superficie fogliare e con infestanti in attiva fase di crescita. Evitare i trattamenti su tappeti erbosi sofferenti. In caso di siccità, irrigare 1-7 giorni prima del trattamento; dopo l'applicazione, attendere almeno 1-3 ore prima di irrigare.

Non tagliare il tappeto erboso per almeno 24 ore dopo il trattamento, per permettere l'azione dell'erbicida. Intervenire su plantule di Poa pratensis, Festuca rubra, F. arundinacea, Lolium perenne emerse da un mese o accestite, con intervalli di 2 mesi tra applicazioni successive.

La semina di rinfoltimento (overseeding) di tappeti di Lolium perenne, Festuca rubra, F. arundinacea può essere effettuata subito dopo il trattamento; per altre specie attendere 3 settimane.

Evitare il trattamento di zolle da trapiantare, un mese prima e un mese dopo la loro rimozione e trapianto.

### FITOTOSSICITÀ

Evitare il contatto con specie non indicate nei settori di applicazione.

### COMPATIBILITÀ

Su tappeti costituiti da Agrostis palustris non miscelare con altri prodotti fitosanitari o fertilizzanti. FOXTAIL non è compatibile con prodotti a base di 2,4 D, MCPA.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

## FOXTAIL (PFnPE)

DISERBANTE GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA PER TAPPETI ERBOSI  
EMULSIONE OLIO/ACQUA

Meccanismo d'azione: HRAC A

FOXTAIL Registrazione del Ministero della Salute n. 12534 del 30/10/2007

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 31/12/2019;

nel caso di concessione di proroga della scadenza del prodotto, la suddetta validità non potrà comunque superare il 02/05/2020

COMPOSIZIONE:

Fenoxaprop-p-etile puro g 2,75 (=28 g/L)

Coformulanti q.b. a g 100

### CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti 32/28

24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officine di produzione:

**Chemia S.p.A.** - S. Agostino (FE)

**I.R.C.A. Service S.r.l.** - Fornovo S. Giovanni (BG)

**Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI)

**CHEMINOVA A/S** - Thyborønvej 78 DK-7673 Harbøre  
(Danimarca)

Contenuto Netto: ml 50, 100

Partita n.:



**ATTENZIONE**

Distribuito da:

Compo Italia S.r.l. - via Marconato, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 03625121ZAPI Industrie

Chimiche S.p.A. - via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel. 049 9597700

ITAL-AGRO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

Green Ravenna srl - Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna - Tel. 0545-012280

Copyr SpA - Via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel. 02/390368.1

Sepran Srl - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976562

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.r.l. - via Desman 43 - 35010 S.Eufemia di Borgoricco (PD) - Tel. 049 9337111

Arysta LifeScience Italia S.r.l. - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304

KOLLANT Srl - via C. Colombo 7/7 A - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9983000

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.**

**REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P362+P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE**

**DISPERSO NELL'AMBIENTE**