

**Prima parte**  
**Etichetta per utilizzatori professionali**

**Seconda parte**  
**Etichetta per utilizzatori non professionali**

# TAIFUN® MK CL

**ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI. TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA**

## TAIFUN MK CL

Registrazione del Ministero della Salute n. 15401 del 22.06.2012

### Composizione

Glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/L)

(da sale isopropilammnico pari a 41 g)

Coformulanti q.b. a 100 g

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpler Str. 6, D-51149 Koln, (Germania)

Tel. 035 328811

### Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd, Ashdod 77102 (Israele)

MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)

CHEMARK Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria

ADAMA Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny (Polonia)

### Distribuito da:

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

### Stabilimenti di confezionamento:

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE)

**Confezioni:** 100 - 500 ml; 1 - 5 - 15 - 20 - 1000\* l

Partita n °vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

Divieto ai fini della protezione delle acque sotterranee dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%, aree vulnerabili e zone di rispetto di cui all'art 93, comma 1 e all'art 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA:** Consultare un centro antiveleni

### CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

**TAIFUN MK CL** è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.

Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.

**TAIFUN MK CL** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

### ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

\* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).

Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)

\* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha di acqua. Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con TAIFUN MK CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen.

### AVVERTENZE:

\* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.

\* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela

\* teme il gelo

\* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila

\* da non impiegare in pre raccolto.

### CAMPI DI IMPIEGO:

\* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.

\* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).

\* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:

-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, soia, bietola da zucchero, rosa.

-vivai e semenzali con applicazione in post - emergenza delle infestanti, di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, soia, riso, prati, vivai.

\* Aree non destinate alle colture agrarie: Argini di canali, fossi e scoline di asciutta.

Aree rurali e industriali. Sedi ferroviarie. Aree ed opere civili (esclusi parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie)..

### DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto.

### Annuali e bienni:

**1 - 3 l/ha :** *Alopecurus* sp. (Coda di volpe), *Avena* sp. (Avena), *Lolium* sp.(Loglietto), *Mercurialis* sp (Mercorella)., *Poa* sp. (Fienarola), *Oriza sativa var. silvatica* (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus* sp. (Amaranto), *Calendula* sp. (Calendula), *Chenopodium* sp.(Farinaccio), *Orobanche* (Succhiametele), *Portulaca* sp. (Porcellana comune), *Raphanus* sp. (Rafano), *Senecio* sp. (Senecio), *Sinapis* sp. (Senape), *Stellaria* sp. (Centocchio), *Veronica* sp. (Veronica)

### Perenni:

**3,5 - 4,5 l/ha :** *Agropyron repens* (Gramaccia), *Carex* sp. (Carice), *Cirsium* sp (Cardo campestre)., *Euphorbia* sp. (Euforbia), *Glyceria* sp. (Gramignone), *Hipericum* sp. (Iperico), *Leersia oryzoidea* (Asperella), *Phalaris* sp. (Falaride) , *Rumex* sp. (Romice), *Sonchus* sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

**5 - 6 l/ha :** *Alisma* sp. (Piantaggine d'acqua), *Asfodelus* sp. (Asfodelo), *Butomus* sp. (Giunco fiorito), *Cyperus* sp. (Cipollino), *Ferula* sp. (Ferula), *Juncus* sp. (Giunco), *Nardus* sp. (Nardo), *Scirpus* sp. (Scirpo), *Sparganium* sp. (Coltellaccio), *Tussilago* sp. (Tossilagine).

**7 - 9 l/ha :** *Agrostis* sp. (Capellini dei campi), *Alium* sp. (Aglio selvatico), *Artemisia* sp. (Assenzio selvatico), *Arundo* sp. (Canna selvatica), *Cynodon* sp. (Gramigna) , *Eragrostis* sp. (Panaceo), *Glechoma* sp. (Ellera), *Oxalis* sp. (Ossalide), *Paspalum* sp., *Phragmites* sp. (Cannuccia), *Pteridium* sp. (Felce), *Ranunculus* sp. (Ranuncolo), *Rubus* sp. (Rovo) , *Tipha* sp. (Tifa), *Urtica* sp. (Ortica).

**10 l/ha :** *Aristolochia* sp. (Aristolachia), *Clematis* sp. (Clematide), *Convolvulus* sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).

### Arbusti:

**4 - 6 l/ha:** *Acer* sp. (Aceri), *Fraxinus* sp. (Frassino), *Genista* sp. (Ginestra), *Salix* sp. (Salice), *Sambucus* sp.( Sanbuc) , *Vaccinium* sp. (Mirtillo)

**10 l/ha:** *Calluna* sp. (Brugo), *Cistus* sp. (Cisto), *Erica* sp. (Erica), *Lonicera* sp. (Caprifoglio).

**Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)**

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

**FITOTOSSICITÀ** : Il prodotto non è selettivo.

**Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA 1000 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.**

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

# TAIFUN® MK CL PFnPE

**ERBICIDA SISTEMICO DI POST - EMERGENZA PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI ANNUALI E PERENNI. TIPO DI FORMULAZIONE: SOLUZIONE CONCENTRATA**

## TAIFUN MK CL

Registrazione del Ministero della Salute n. 15401 del 22.06.2012  
Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020

### Composizione

Glifosate acido puro 30,8 g (=360 g/L)  
(da sale isopropilamminico pari a 41 g)  
Coformulanti q.b. a 100 g

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

### INDICAZIONI DI PERICOLO:

**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### ADAMA Deutschland GmbH

Edmund Rumpfer Str. 6, D-51149 Köln, (Germania)  
Tel. 035 328811

### Stabilimenti di produzione:

ADAMA AGAN Ltd, Ashdod 77102 (Israele)  
MONSANTO EUROPE S.A./N.V., B-2040 Antwerp (Belgio)  
CHEMARK Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria  
ADAMA Manufacturing Poland S.A. - Brzeg Dolny (Polonia)

### Distribuito da:

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)

### Stabilimenti di confezionamento:

ZAPI S.p.A.- Conselve (PD)  
KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE)

### Confezioni: 100 - 500 ml

Partita n °vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per evitare pericoli all'uomo e all'ambiente, attenersi alle istruzioni per l'uso.

Divieto ai fini della protezione delle acque sotterranee dell'uso non agricolo su: suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%, aree vulnerabili e zone di rispetto di cui all'art 93, comma 1 e all'art 94, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**AVVERTENZA:** Consultare un centro antiveleni

### CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO:

**TAIFUN MK CL** è un erbicida da impiegarsi in post emergenza delle erbe infestanti nel controllo di specie mono e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perenni.

Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti.

**TAIFUN MK CL** non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microorganismi presenti nell'ambiente.

### ATTREZZATURE, QUANTITÀ D'ACQUA E MISCELE:

\* Per evitare il contatto con le colture da diserbare impiegare pressioni basse ed attrezzature selettive o munite di schermo protettivo o munite di ugelli con spruzzo controllato (GDC, specchio, ventagli).

Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con le attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermante)

\* Non impiegare più di 200 - 400 l/ha di acqua. Qualora sia necessario controllare le infestanti che nascono successivamente al trattamento con TAIFUN MK CL, impiegare prodotti ad azione residuale quali ad esempio Oxifluorfen.

### AVVERTENZE:

\* impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari é inefficace.

\* agitare bene prima dell' uso sia la confezione che la miscela

\* teme il gelo

\* l'impiego su mais è consentito solo sull'interfila

\* da non impiegare in pre raccolto.

### CAMPI DI IMPIEGO:

\* Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato: Agrumi, Pomacee (melo, pero), noce, nocciolo, olivo e vite da vino e da tavola.

\* Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce anche il tronco ben lignificato: Drupacee (albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino).

\* Colture per le quali l'impiego è possibile solo con l'uso di attrezzature selettive o schermate:

-ortaggi (carciofo, carota, fagiolino, fava, melanzana, pisello, pomodoro), patata, mais, bietola da zucchero, rosa.

Terreni senza coltura con applicazione in post - emergenza delle infestanti, in pre-semina, pre-trapianto o post-raccolta: fragola, ortaggi, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, prati.

### DOSI :

Queste variano in funzione della sensibilità dell'infestante e del tipo di attrezzatura impiegata.

Per il diserbo delle infestanti elencate non superare la dose di 10 l/ha/anno di prodotto.

### Annuali e bienni:

**1 - 3 l/ha :** *Alopecurus* sp. (Coda di volpe), *Avena* sp. (Avena), *Lolium* sp.(Loglietto), *Mercurialis* sp (Mercorella)., *Poa* sp. (Fienarola), *Oriza sativa var. silvatica* (Riso crodo), *Ammi majus* (Visnaga maggiore), *Amaranthus* sp. (Amaranto), *Calendula* sp. (Calendula), *Chenopodium* sp.(Farinaccio), *Orobanche* (Succhiamele), *Portulaca* sp. (Porcellana comune), *Raphanus* sp. (Rafano), *Senecio* sp. (Senecio), *Sinapis* sp. (Senape), *Stellaria* sp. (Centocchio), *Veronica* sp. (Veronica)

### Perenni:

**3,5 - 4,5 l/ha :** *Agropyron repens* (Gramaccia), *Carex* sp. (Carice), *Cirsium* sp (Cardo campestre)., *Euphorbia* sp. (Euforbia), *Glyceria* sp. (Gramignone), *Hipericum* sp. (Iperico), *Leersia oryzoides* (Asperella), *Phalaris* sp. (Falaride) , *Rumex* sp. (Romice), *Sonchus* sp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

**5 - 6 l/ha :** *Alisma* sp. (Piantaggine d'acqua), *Asfodelus* sp. (Asfodelo), *Butomus* sp. (Giunco fiorito), *Cyperus* sp. (Cipollino), *Ferula* sp. (Ferula), *Juncus* sp. (Giunco), *Nardus* sp. (Nardo), *Scirpus* sp. (Scirpo), *Sparganium* sp. (Coltellaccio), *Tussilago* sp. (Tossilagine).

**7 - 9 l/ha :** *Agrostis* sp. (Capellini dei campi), *Alium* sp. (Aglio selvatico), *Artemisia* sp. (Assenzio selvatico), *Arundo* sp. (Canna selvatica), *Cynodon* sp. (Gramigna) , *Eragrostis* sp. (Panaceo), *Glechoma* sp. (Ellera), *Oxalis* sp. (Ossalide), *Paspalum* sp., *Phragmites* sp. (Cannuccia), *Pteridium* sp. (Felce), *Ranunculus* sp. (Ranuncolo), *Rubus* sp. (Rovo) , *Tipha* sp. (Tifa), *Urtica* sp. (Ortica).

**10 l/ha :** *Aristolochia* sp. (Aristolachia), *Clematis* sp. (Clematide), *Convolvulus* sp. (Vilucchio), *Rubia peregrina* (Robbia).

### Arbusti:

**4 - 6 l/ha:** *Acer* sp. (Aceri), *Fraxinus* sp. (Frassino), *Genista* sp. (Ginestra), *Salix* sp. (Salice), *Sambucus* sp.( Sanbuc) , *Vaccinium* sp. (Mirtillo)

**10 l/ha:** *Calluna* sp. (Brugo), *Cistus* sp. (Cisto), *Erica* sp. (Erica), *Lonicera* sp. (Caprifoglio).

**Per il diserbo dell'olivo (olive da olio) per il controllo delle infestanti sopra indicate la dose massima di impiego è di 6 litri/ha (corrispondenti a 2,16 kg/ha di sostanza attiva)**

**AVVERTENZA:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.

**FITOTOSSICITÀ :** Il prodotto non è selettivo.

**Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo (olive da olio) sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**LO STOCCAGGIO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DEL CONTENITORE DA 1000 LITRI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN ZONA DOTATA DI BACINO DI CONTENIMENTO DI ADEGUATO VOLUME ATTO A RACCOGLIERE EVENTUALI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO.**

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE  
ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**